

















Información sobre los métodos anticonceptivos



Conoce más sobre cada método anticonceptivo

Información sobre los métodos	Características de los métodos anticonceptivos				
	Acción anticonceptiva*	Uso	Vía de administración	Método hormonal	Protección frente a ITS
 Implante	99,95%	3 años	Subcutánea	✓	✗
 Esterilización masculina	99,85%	Permanente	Quirúrgica	✗	✗
 DIU hormonal	99,80%	3-8 años	Intrauterina	✓	✗
 Esterilización femenina	99,50%	Permanente	Quirúrgica	✗	✗
 DIU de cobre	99,20%	5-10 años	Intrauterina	✗	✗
 Inyección anticonceptiva	94,00%	Cada 12 semanas	Intramuscular	✓	✗
 Anillo vaginal	91,00%	Cada 4 semanas	Vaginal	✓	✗
 Píldora combinada	91,00%	Diaria	Oral	✓	✗
 Píldora de solo gestágeno	91,00%	Diaria	Oral	✓	✗
 Parche	91,00%	Semanal	Transdérmica	✓	✗
 Diafragma	88,00%	Al tener relaciones	Vaginal	✗	✗
 Preservativo masculino	82,00%	Al tener relaciones	Sobre el pene	✗	✓
 Preservativo femenino	79,00%	Al tener relaciones	Vaginal	✗	✓
 Coitus interruptus	78,00%	Al tener relaciones	N/A	✗	✗
 Conocimiento de la fertilidad	76,00%	Diaria	N/A	✗	✗
 Espermicida	72,00%	Al tener relaciones	Vaginal	✗	✗

* Datos de la Organización Mundial de la Salud que indican el porcentaje de mujeres que no se quedaron embarazadas durante el primer año con el uso típico del método, que incluye su uso inconsistente o incorrecto.

No se recomienda utilizar el método anticonceptivo de forma distinta a la descrita en las instrucciones de uso.

N/A: no aplica. ITS: Infecciones de transmisión sexual.

El contenido que se proporciona en esta literatura es información general.

En ningún caso debe sustituir ni la consulta, ni el tratamiento, ni las recomendaciones de tu médico.